

# تفشي مرض فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية

(28 أبريل 2022)

## الإعلان عن التفشي

22 أبريل 2022

أعلنت السلطات الصحية التابعة لمجلس الأمم الإفريقية تشخيص حالة واحدة مؤكدة لمواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية يبلغ من العمر 31 عامًا.

5 أبريل 2022

بدأ ظهور الأعراض

21 أبريل 2022

- تم إدخاله إلى العناية المركزة في يوم، وتوفي بعد يوم واحد.

25 أبريل 2022

تم تشخيص الحالة الثانية لامرأة عمرها 25 عامًا من العائلة نفسها، وتوفيت في اليوم نفسه، لكن الأعراض بدأت في 13 أبريل.

يتم متابعة المئات من المخالطين المحتملين، ولم تسجل حالات جديدة بعد.

لا يوجد توجيهات محددة من منظمة الصحة العالمية بشأن هذا التفشي بعد.



## أعراض مرض فيروس إيبولا وتطور الحالات



- تبدأ بحمى، وإعياء، وألم في العضلات، وصداع، والتهاب الحلق.
- يتبعها استفراغ، وإسهال، وطفح جلدي، وأعراض قصور وظائف الكلى والكبد، ونزيف داخلي وخارجي.
- نسبة الوفيات من مضاعفات المرض تراوح بين 25% و90%.

## الانتشار والتاريخ الوبائي



- الحاضن للفيروس هو بعض الحيوانات البرية، وأهمها: خفاش الفواكه، والشمبانزي، والقروود.
- ينتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان.
- ينتقل بين الناس بشكل مباشر من خلال إفرازات الجسم، وبشكل غير مباشر من خلال استخدام الأغراض الشخصية الملوثة.
- بدأ أول تفشٍ في عام 1976 في جمهورية إفريقيا الوسطى.
- من عام 1976م، تم تسجيل 16 تفشياً وبائياً في بعض الدول الإفريقية.

## التشخيص



يتم تشخيص الحالات وتأكيدها بناء على الفحوصات المخبرية وأهمها قياس الأجسام المضادة للفيروس، وفحص تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR).

## العلاج



- علاج تلطيفي للأعراض وأهمها الإرواء.
- تم إجازة دوائين اثنين من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2020م، هما: (Inmazole) و (Ebanga)، وهما أجسام مضادة للفيروس.

## مكافحة المرض والوقاية منه



- التوعية الصحية حيال طرق انتقال الفيروس.
- لقاح (Ervebo)، وتم إجازته في عام 2022م، ويعطى لمن هم في عمر 18 عامًا فأكثر.
- لقاح (Zebadeno)، وتم إجازته في عام 2020م، ويعطى على جرعتين بينهما 8 أشهر لمن هم في عمر عام واحد فأكثر.