

الاشتراطات والإرشادات الصحية لأداء مناسك الحج من حجاج الداخل لعام ١٤٤٧هـ (٢٠٢٦م)

التحصينات اللازمة:

الحى الشوكية النيسيرية:

- يُشترط على جميع الراغبين في أداء الحج الحصول على أحد اللقاحات التالية (والتي تحتوي على المجموعات المصلية ACWY) قبل بدء مناسك الحج بـ (١٠) أيام:
١. لقاح الحى الشوكية الرباعي المقترن^٢ (ACYW) أو لقاح الحى الشوكية الخماسي المقترن (ACWXY) على ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن (١٠) أيام ولا تزيد منذ تلقي اللقاح عن (٥) سنوات.
 ٢. أو لقاح الحى الشوكية الرباعي متعدد السكريات (ACYW)، على ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن (١٠) أيام ولا تزيد عن (٣) سنوات.

التحصينات الموصى بها:

١/ الانفلونزا الموسمية

يوصى بها لجميع الراغبين في أداء الحج الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية أن تكون الجرعة المعطاة للحاج بعد تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥م وقبل بدء مناسك الحج بـ ١٠ أيام

٢/ كوفيد-١٩:

يوصى بالحصول على لقاح كوفيد-١٩ المحدث لموسم ٢٠٢٥م - ٢٠٢٦م لجميع الراغبين في أداء الحج وخصوصاً الفئات التالية:

- من تزيد أعمارهم عن ٦٥ سنة
 - النساء الحوامل
 - من لديهم الأمراض التالية:
 - أمراض القلب المزمنة
 - أمراض الجهاز التنفسي المزمنة
 - الفشل الكلوي المزمن
 - أمراض الدم الوراثية (الأنيميا المنجلية، الثلاسيميا)
 - ضعف المناعة الخلقي أو الناجم عن الأدوية المثبطة أو السرطان
 - أمراض الجهاز العصبي المزمنة.
- أن تكون الجرعة المعطاة للحاج بعد تاريخ ١ يناير ٢٠٢٥م وقبل بدء مناسك الحج بـ ١٠ أيام،

