

علاج الدرن

تمتد فترة علاج الدرن إلى ستة أشهر يتناول خلالها المريض مجموعة من الأدوية المضادة للدرن والتي تحقق الشفاء التام، بشرط أن ينتظم المريض في تناول الدواء حسب توصيات الطبيب من خلال استراتيجية تسمى المعالجة قصيرة الأمد تحت الإشراف المباشر.

المعالجة قصيرة الأمد تحت الإشراف المباشر DOTS

نظراً لطول فترة العلاج وإمكانية انقطاع المرضى عنه فقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية هذه الاستراتيجية ، وهي تعنى ملاحظة المريض أثناء تناول الدواء من قبل أحد أفراد الفريق الصحي أو أحد أفراد عائلته، فقد أثبتت هذه الاستراتيجية أنها الأكثر فعالية لمكافحة وباء السل حالياً حيث أنها:

- تحقيق معدلات شفاء تقترب من ٩٥ % حتى في أكثر البلدان فقرأ.
- تمنع حدوث حالات عدوى جديدة عن طريق شفاء المرضى حاملين العدوى.
- تمنع ظهور حالات السل المقاوم للأدوية المتعددة عن طريق ضمان إلتزام المرضى بتناول المعالجة حتى إكمالها.

ما هو السُّل المقاوم للأدوية المتعددة؟

هو شكل معين من أشكال الدرن تسببه عصيات مقاومة لأدوية علاج الدرن وقد تطول فترة العلاج البديل مثل هذه الحالات إلى أكثر من سنتين مع ارتفاع كلفة العلاج بصورة كبيرة جداً وانخفاض فرص الشفاء.

كيف يصبح السُّل حساساً للأدوية مقاوماً لها؟


تنتج مقاومة الدرن للأدوية عند الاستخدام غير السليم لمضادات الدرن ومن أهم أسبابها انقطاع المرضى عن العلاج أو عدم تناوله بإانتظام وفق الجرعات المخصصة من قبل الطبيب مع عدم خضوع المرضى للإشراف المباشر.

المملكة العربية السعودية



وكالة الصحة العامة

الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية



البرنامج الوطني لمكافحة الدرن

National Tuberculosis Control & Prevention Program

فلنتحد
للقضاء على مرض الدرن

إرشادات لمرضى الدرن

إنك تلعب دوراً هاماً في تحقيق شفاءك بإذن الله إذا إتبعت الإرشادات الآتية:

- ١- تناول الدواء والمعدة خالية ثم إشرب معه كمية كبيرة من الماء والعصائر.
- ٢- المراجعة المنتظمة للمستشفى والمركز الصحي حسب إرشادات الطبيب ضرورة ملحة.
- ٣- تأكد دائماً من وجود كميات مناسبة من الدواء بصفة مستمرة حتى لا تقطع عن العلاج.
- ٤- تقوم وزارة الصحة بتوفير الدواء مجاناً للمواطنين والمقيمين في المرافق المعالجة للدرن.
- ٥- قم باستشارة طبيبك عند استخدام أدوية قد تتعارض مع الدرن.
- ٦- امتنع عن التدخين فهو يدمي الرئة والقلب ويضعف المناعة، وابتعد عن الكحول.
- ٧- لا تقطع عن تناول العلاج حتى وإن شعرت بأن حالتك تحسنت فتحسن حالتك في بداية العلاج معناه أنك استجبت للعلاج وليس معناه شفاؤك من المرض.
- ٨- بادر بعرض المخالطين على أقرب مرافق صحي.
- ٩- بادر بتطعيم طفلك ضد مرض الدرن عقب الولادة مباشرة.
- ١٠- يجب تهوية منزلك جيداً وتعرض فراشك لأشعة الشمس وعليك التقدية الجيدة.
- ١١- عند إنتقالك من عنوانك يجب إبلاغ المركز الصحي أو مركز الدرن بذلك حتى يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة العلاج.

مع تمنياتنا لك بالشفاء العاجل إن شاء الله
مع تحيات البرنامج الوطني لمكافحة الدرن

حقائق حول الدرن (السل)

ما هو مرض السل؟

هو مرض معدى تسببه المتفطرة السلية والتي اكتشفها العالم الألماني روبرت كوخ ٢٤ مارس ١٨٨٢م، وغالباً ما يصيب الرئتين ومن الممكن أن يصيب أجزاء أخرى من الجسم مثل الفشائبلبوري والغدد الليمفاوية والعظام والجهاز البولي التناصلي.

مسبب المرض

تشاً الأصابة بالمرض نتيجة العدوى بعصيات السل والتي تنقل من الشخص المصاب بالسل الرئوي النشط إلى الشخص المخالط أو عن طريق تناول الألبان الملوثة غير المغلية أو غير المبisterة.

خصائص عصيات السل:

هو ميكروب لا يرى بالعين المجردة ويظهر على شكل عصيات يعيش في البيئة المغلقة لسنوات ويموت عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة وبالغليان خلال دقائق.

طرق العدوى:

- استنشاق الرذاذ المحظى على عصيات بالسل والصادر من فم وأنف المرضى المصابين بالدرن الرئوي أو الدرن الحنجري أثناء السعال أو العطس
- أدوات المريض الملوثة.
- شرب الحليب الملوث غير المغلي أو غير المبister من الأبقار المصابة.

العوامل التي تساعد على الإصابة بالدرن

يمكن لأي إنسان أن يصاب بعدوى عصيات السل ويعتمد ذلك على كفاءة الجهاز المناعي.
أما العوامل التالية فترتبط بمعدل قابلية أكثر للإصابة بالمرض:

- الاختلاط المباشر مع مريض مصاب بالسل الرئوي النشط.
- ضعف الجهاز المناعي لأسباب وراثية أو مكتسبة مثل الأيدز والأمراض المزمنة كالسرطان والسكر والفشل الكلوي وتناول الأدوية المثبطة للمناعة.
- الفقر وسوء التغذية.
- الحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية.

ما هي أعراض المرض؟

الشخص المصاب بالسل الرئوي قد تظهر عليه أي من الأعراض التالية أو جميعها.

- سعال مستمر مع بقلم قد يكون مصحوباً بالدم.
- الحمى والتعرق الليلي.
- فقدان الشهية.
- التعب.
- ضيق التنفس.
- نقص الوزن.



أما الأعراض الأخرى فيعتمد ظهورها على العضو المصاب مثل:

- تورم بالغدد الليمفاوية مع نزح قيحي عند إصابتها.
- ألم وتورم عند إصابة المفاصل.
- صداع وحمى وتيبيس العنق ونعاس عند الإصابة بـ التهاب السل السحاجي.

عند الاشتباه في إصابة مريض بالدرن بمركز الرعاية الصحية الأولية يقوم الطبيب بتحويل المريض إلى المستشفى لتأكيد التشخيص مع متابعة وصول المريض إلى المستشفى ومتابعة التشخيص النهائي.

كيف يمكن تشخيص الدرن الرئوي؟

يتم تشخيص الإصابة بالدرن الرئوي عن طريق التاريخ المرضى للمريض والفحص السريري والفحوص التشخيصية، يعتبر الفحص المجهري للبلغم هو أكثر الطرق فعالية في اكتشاف الدرن.

كما يتم متابعة استجابة مرضي الدرن الرئوي إيجابي القشع عن طريق فحص عينات البلغم في نهاية كل من الشهر الثاني والرابع والسادس من العلاج للحالات الجديدة.

التطعيم ضد الدرن عند الولادة يحمي الأطفال من الدرن الدخني والتهاب السحايا الدرني.

تقوم وزارة الصحة بتبني جميع أنشطة مكافحة السل من تشخيص وعلاج ومتابعة مجاناً في المنشآت الصحية التابعة لها من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الدرن.

صدرت موافقة المقام السامي الكريم في ١٤٢٤/١٢/٣ هـ على علاج جميع مرضى الدرن من غير السعوديين من يحملون إقامة نظامية بالمملكة العربية السعودية وعدم ترحيلهم.