

وزارة الصحة
Ministry of Health




الدرن

ماهو الدرن؟

مرض بكتيري معد يهاجم الرئتين،
وقد يصيب أجزاء أخرى من الجسم.





وزارة الصحة
Ministry of Health

ماهي أنواع الإصابة؟

نشط

البكتيريا نشطة وتنمو
في الجسم



يوجد أعراض



ينقل العدوى للآخرين إذا كان
في الرئة أو الحنجرة



يؤدي للوفاة إذا لم يتم
معالجته



خامل

البكتيريا خاملة



لا يوجد أعراض



لا ينقل العدوى



ويمكن معالجته
والوقاية منه



يتطور ليكون نشط



كيف ينتقل؟

تنتشر البكتيريا عبر الهواء عن طريق سعال أو عطاس المصاب حيث يمكن إلتقاط العدوى عن طريق التنفس



من هم الأكثر عرضة للإصابة به؟

المخالطين لحالات الدرن الرئوي
أو درن الحنجرة



المصابين بأمراض مزمنة كداء السكري
والمرضى المصابين بنقص المناعة



المدخنين ومتعاطي الكحول



حالات الدرن الكامن



ماهي أعراض الإصابة به؟



كحة مستمرة
لأكثر من أسبوعين



فقدان الوزن



ضعف عام



ضيق في التنفس
مع ألم في الصدر



حمى



تعرق في الليل

كما يمكن للسعال أن يصيب أي عضو بالجسم
(سعال خارج الرئة)

الدرن حول العالم

في عام ٢٠٢٠م:

١٠ مليون
إصابة درن نشط

٥.١ مليون
وفاة

الدرن في السعودية


في عام ٢٠٢١م:

 ٢٦٣٣
حالة إصابة بالدرن

 ٧.٤%
معدل الإصابة للدرن

كيف يتم الفحص عن الدرن؟

فحص الدرن الرئوي النشط:




فحص السل الكامن:




بالتشخيص المبكر نمنع من:



نساعد في:



كيف تتم معالجته؟



مجموعة من المضادات البكتيرية

 **المدة:** الدرر الرئوي الغير مقاوم للأدوية
٦ أشهر

عدم الالتزام

بأخذ العلاج في المدة المحددة يتسبب في:



طول مدة
العلاج



الإصابة من
جديد



مقاومة البكتيريا
للدواء

 لتصبح مدة العلاج: ٩ - ٢٠ أشهر

مقاومة الدرن للأدوية



هو قدرة البكتيريا على مقاومة الأدوية المستخدمة لعلاج الدرن؛ مما يؤدي إلى الحد أو إيقاف فعالية الأدوية المستخدمة، وتحدث هذه المقاومة بسبب عدم الانتظام في تناول أدوية الدرن أو إيقاف استخدامها قبل انتهاء المدة المحددة للعلاج.

إذا توقفت عن تناول أدوية علاج الدرن
مبكرًا أو إذا كُنت لا تتناولها
بالطريقة الصحيحة:

01

يمكن أن تعود لك الأعراض مرةً أخرى وتبقى مريضًا لفترة أطول

02

يمكن أن تتوقف الأدوية عن مفعولها وقد تضطر إلى تناول أدوية مختلفة لها آثار جانبية أكثر.

03

قد تزيد مقاومة البكتيريا وحتى الأدوية الجديدة قد لا تعمل في علاج مرض الدرن

04

يمكن أن تنقل العدوى إلى الآخرين

نصائح عامة عند استعمال أدوية الدرن

الأعراض الجانبية الشائعة عند استخدام دواء (ريفامبيسين) مثل: تغير لون سوائل الجسم (العرق، البول، الدموع أو اللعاب) إلى اللون البرتقالي لا تستدعي القلق



يجب دائمًا أن تستشير طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء جديد؛ لأن أدوية علاج الدرن تتعارض مع الكثير من الأدوية الأخرى




يُعطى (فيتامين ب 6) مع دواء (ايزونيازايد) لجميع الأشخاص المعرضين للإصابة بالاعتلال العصبي (على سبيل المثال: النساء الحوامل، المرضعات، الأبناء المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية [HIV]، المرضى الذين يعانون من مرض السكري أو إدمان الكحول أو سوء التغذية أو الفشل الكلوي أو كبار السن)



كيف يمكن الوقاية منه؟

أخذ لقاح الدرن (BCG) بعمر
٦ أشهر



تجنب زيارة الدول الموبوءة



لبس الكمامة وغسل اليدين
باستمرار عند مخالطة
المصاب و عند الإصابة



الالتزام بأخذ الدواء في حالات
الدرن الكامن




الالتزام بأخذ وإكمال العلاج
في حالات الدرن النشط





وزارة الصحة
Ministry of Health


جدول التطعيمات الوطني



* لقاح البكتيريا العقدية الرئوية (PCV١٣)

** لقاح الروتا الأحادي

*** يعطى الثنائي البكتيري ابتداء من ٧ سنوات



وزارة الصحة
Ministry of Health

خلال فترة استخدام العلاج يجب **مراجعة الطبيب فوراً عند ظهور أحد هذه الأعراض** (ضبابية أو تغير في الرؤية، فقدان الشهية غير المبرر، الغثيان والقيء، وخز مستمر أو تنميل في اليدين أو القدمين، تغير لون البول الى البني، اصفرار الجلد أو العينين)



ينصح بأخذ دواء آيزونيازيد و فيتامين ب6 (Vitamin B6) مع (Isoniazid) في نفس اليوم و لكن في اوقات مختلفة **فيعطى فيتامين B6 بعد الاكل ويعطى Isoniazid آيزونيازيد قبل الاكل**



هل أعجبك هذا الملف؟

هنا تجد المزيد



@LiveWellMOH



@LiveWellMOH



@LiveWell